

Банк тестовых заданий

ПМ.03. Неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе.

МДК.03.01. Дифференциальная диагностика и оказание неотложной медицинской помощи на догоспитальном этапе.

**Раздел 5. Оказание неотложной помощи при отравлениях.
специальность 31.02.01 Лечебное дело**

- 401. Антидотом при отравлении наркотическими препаратами является:**
- а) героин
 - б) налорфин
 - в) нашатырный спирт
 - г) этиловый спирт
- 402. Первым достоверным признаком отравления метиловым спиртом является:**
- а) состояние, сходное с алкогольным опьянением, потеря зрения вплоть до слепоты, нитевидный пульс, одышка, головная боль, тошнота, снижение АД
 - б) алкогольное опьянение, тошнота, рвота с примесью алой крови, увеличение печени, снижение АД
 - в) алкогольное опьянение, тошнота, рвота, частый жидкий стул, боль в животе, снижение АД.
 - г) алкогольное опьянение, тошнота, рвота «кофейной гущей», слабость, снижение АД.
- 403. Основной задачей интенсивной терапии гиповолемического шока на догоспитальном этапе является:**
- а) восполнение дефицита объема циркулирующей жидкости крови
 - б) стимуляция сократительной способности миокарда
 - в) улучшение реологических свойств крови
 - г) дегидратация
- 404. Ингаляция кислорода на догоспитальном этапе противопоказана при отравлении:**
- а) хлором
 - б) угарным газом
 - в) аммиаком
 - г) сероводородом
- 405. Общий принцип лечения острых отравлений на догоспитальном этапе:**
- а) антидотная терапия
 - б) активная детоксикация

- в) промывание желудка
 - г) посиндромная неотложная помощь
- 406. Симптомы, говорящими о том, что доза атропина, при отравлении ФОС, достаточна, являются:**
- а) увеличение влажности кожи
 - б) сужение зрачков, увеличение влажности кожи
 - в) появлению сухости кожи и слизистых, уменьшение слюноотделения, расширению зрачков:
 - г) уменьшению тахикардии, сужению зрачков
- 407. Доза этилового спирта, применяемого для взрослого человека, при отравлении метиловым спиртом, составит:**
- а) 30% 20,0 через каждые 3 часа
 - б) 30% 50,0 через каждые 3 часа
 - в) 30% 100,0 через 4 часа
 - г) 30% 200,0 два раза в сутки
- 408. При остром отравлении неизвестным ядом на догоспитальном этапе:**
- а) внутримышечно вводят унитиол
 - б) внутривенно вводят атропин
 - в) внутривенно вводят налоксон
 - г) универсального антидота не существует
- 409. Путем поступления дихлорэтана в организм при отравлении является (найдите ошибочный ответ):**
- а) ингаляционный
 - б) энтеральный
 - в) парентеральный
 - г) чрезкожный
- 410. Химический ожог ротоглотки, пищевода и желудка соответствует ожогу:**
- а) 10 % поверхности тела
 - б) 20 % поверхности тела
 - в) 30 % поверхности тела
 - г) 40 % поверхности тела
- 411. Налоксон применяется при отравлении (найдите ошибочный ответ):**
- а) героином
 - б) морфином

- в) кокаином
- г) метадоном

412. Зондовое промывание желудка при острых энтеральных отравлениях на догоспитальном этапе:

- а) показано в любых клинических ситуациях
- б) противопоказано при коме при невозможности интубации трахеи
- в) противопоказано при химическом ожоге пищевода
- г) не показано при неустановленном пути поступления яда

413. Отравление этиленгликолем проявляется (найдите ошибочный ответ)

- а) поведенческими признаками выраженного опьянения
- б) тошнотой, рвотой
- в) интенсивной болью в животе
- г) ригидностью затылочных мышц

414. К методам детоксикации относятся:

- а) форсированный диурез
- б) гемодиализ
- в) гемосорбция
- г) все ответы правильные

415. Отравление мухомором проявляется (найдите ошибочный ответ):

- а) галлюцинациями
- б) мидриазом
- в) бронхореей
- г) тошнотой, рвотой, поносом

416. Первоочередным мероприятием при отравлении метанолом на догоспитальном этапе является:

- а) промывание желудка
- б) внутривенное введение налоксона
- в) внутримышечное введение унитиола
- г) введение этилового спирта внутрь

417. Характерным признаком отравления кокаином является (найдите ошибочный ответ):

- а) бледность кожных покровов
- б) миоз
- в) одышка
- г) тахикардия

- 418. Химический ожог пищеварительного тракта развивается при отравлении:**
- а) аспирином
 - б) фенолом
 - в) крепкими кислотами
 - г) метиловым спиртом
- 419. Боль и жжение в глазах, носу, ротоглотке, стридорозное дыхание, «лающий» кашель, характерны для ингаляционного отравления (найдите ошибочный ответ):**
- а) хлором
 - б) угарным газом
 - в) аммиаком
 - г) сероводородом
- 420. Характерным признаком отравления опиатами является (найдите ошибочный ответ):**
- а) угнетение сознания
 - б) миоз
 - в) одышка
 - г) брадикардия
- 421. В качестве антидота при отравлении метиловым спиртом применяется:**
- а) унитиол
 - б) налоксон
 - в) прозерин
 - г) этанол
- 422. В качестве антидота при отравлении фосфорорганическими веществами на догоспитальном этапе применяется:**
- а) прозерин
 - б) налоксон
 - в) атропин
 - г) унитиол
- 423. « Обручеобразная» головная боль, нарушение сознания, инспираторная одышка, рвота, вишневая окраска слизистых оболочек и кожных покровов характерны для ингаляционного отравления:**
- а) хлором
 - б) угарным газом

- в) аммиаком
 - г) сероводородом
- 424. При отравлении барбитуратами наблюдается (найдите ошибочный ответ):**
- а) возбуждение
 - б) депрессия дыхания
 - в) снижение рефлексов
 - г) артериальная гипотензия
- 425. Для промывания желудка через зонд при отравлении кислотами на догоспитальном этапе применяется:**
- а) вазелиновое масло
 - б) раствор бикарбоната натрия
 - в) холодная вода
 - г) слабый раствор перманганата калия
- 426. При отравлении опиатами, сопровождающемся комой и депрессией дыхания, первоочередным лечебным мероприятием, на догоспитальном этапе является:**
- а) промывание желудка через зонд
 - б) восстановление проходимости дыхательных путей и начало искусственной вентиляции легких
 - в) внутривенное введение налоксона
 - г) внутривенное введение кордиамина
- 427. Депрессия дыхательного центра ствола головного мозга развивается при отравлении:**
- а) героином
 - б) дихлорэтаном
 - в) фосфорорганическими веществами
 - г) кокаином
- 428. В качестве антидота при отравлении метгемоглобинообразующими ядами применяется:**
- а) унитиол
 - б) метиленовый синий
 - в) прозерин
 - г) этанол
- 429. При отравлении бензодиазепинами в качестве антидота применяется:**

- а) налоксон
- б) анексат
- в) атропин
- г) прозерин

430. Эффективное промывание желудка взрослому при остром отравлении на догоспитальном этапе требует суммарного введения воды в объеме:

- а) 2 – 5 л
- б) 6 – 9 л
- в) 10 – 12 л
- г) 16 – 20 л

431. К бензодиазепинам относится (найдите ошибочный ответ):

- а) тазепам
- б) аминазин
- в) седускен
- г) феназепам

432. При отравлении опиатами в качестве антидота на догоспитальном этапе применяется:

- а) атропин
- б) кордиамин
- в) налоксон
- г) прозерин

433. Отравление клофелином характеризуется (найдите ошибочный ответ):

- а) сонливостью
- б) возбуждением
- в) брадикардией
- г) артериальной гипотензией

434. При отравлении атропином, беленой и другими антихолинэргическими веществами в качестве антидота на догоспитальном применяется:

- а) налоксон
- б) прозерин
- в) унитиол
- г) метиленовый синий

435. Отравление метиловым спиртом проявляется (найдите ошибочный ответ):

- а) поведенческими признаками выраженного опьянения

- б) нарушением зрения
 - в) многократной рвотой
 - г) выраженной головной болью
- 436. В качестве антидота при отравлении этиленгликолем применяется:**
- а) унитиол
 - б) налоксон
 - в) прозерин
 - г) этанол
- 437. Болевой синдром характерен для отравления:**
- а) кислотами и щелочами
 - б) амитриптилином
 - в) опиатами
 - г) барбитуратами
- 438. Введение желудочного зонда на догоспитальном этапе при отравлении ядами прижигающего действия:**
- а) противопоказано в любом случае
 - б) противопоказано в течении первых 2 –х часов после отравления
 - в) показано после премедикации
 - г) показано только у больных в коме
- 439. В рациональный комплекс догоспитальной терапии при отравлении кислотами входит (найдите ошибочный ответ):**
- а) обезболивание
 - б) обработка пищевода и желудка подсолнечным маслом
 - в) прием спазмолитиков
 - г) инфузионная терапия
- 440. Отравление фосфорорганическими веществами проявляется (найдите ошибочный ответ):**
- а) гипергидрозом
 - б) мидриазом
 - в) миофибрилляциями
 - г) слюнотечением и бронхореей
- 441. Паралич дыхательной мускулатуры развивается при отравлении:**
- а) героином
 - б) дихлорэтаном
 - в) фосфорорганическими веществами

- г) кокаином
- 442. К критериям прекращения введения атропина при отравлении фосфорорганическими веществами на догоспитальном этапе относится исчезновение (найдите ошибочный ответ):**
- а) миоз
 - б) гиперсаливация и бронхорея
 - в) тахикардия
 - г) гипергидроз
- 443. Обязательным лечебным мероприятием при отравлении угарным газом на догоспитальном этапе является**
- а) промывание желудка
 - б) оксигенотерапия
 - в) внутривенное введение налоксона
 - г) внутримышечное введение унитиола
- 444. Развитие токсического отека легких после периода «мнимого» выздоровления характерно для отравления:**
- а) хлором
 - б) угарным газом
 - в) аммиаком
 - г) сероводородом
- 445. Металлический вкус во рту, боль в полости рта и при глотании, сильная боль в животе и жидкий стул наблюдается при отравлении (найдите ошибочный ответ):**
- а) мышьяком
 - б) солями меди
 - в) нитробензолом
 - г) соединениями свинца
- 446. Налоксон применяется при отравлении (найдите ошибочный ответ):**
- а) героином
 - б) морфином
 - в) кокаином
 - г) метадоном
- 447. Отравление этиленгликолем проявляется (найдите ошибочный ответ):**
- а) поведенческими признаками выраженного опьянения
 - б) тошнотой, рвотой

- в) интенсивной болью в животе
- г) ригидностью затылочных мышц

448. Отравление мухомором проявляется (найдите ошибочный ответ):

- а) галлюцинациями
- б) мидриазом
- в) бронхореей
- г) тошнотой, рвотой, поносом

449. Химический ожог пищеварительного тракта развивается при отравлении (найдите ошибочный ответ):

- а) аспирином
- б) фенолом
- в) крепкими кислотами
- г) щелочами

450. Характерным признаком отравления кокаином является (найдите ошибочный ответ):

- а) бледность кожных покровов
- б) миоз
- в) одышка
- г) тахикардия